El Médic@ adict@

Una exposición narrativa de la experiencia del
Comité de Salud Ocupacional de la
Sociedad Chilena de Anestesiología

Dr. Juan Pablo Acuña
Dr. Juan Pablo Álvarez

¡AH, NO! ENTONCES ES EVIDENTE QUE LO CONFUNDÍ CON ALGUIEN MÁS VINCULADO A MI PROFESIÓN; ES QUE ASÍ EN SHORTS SOMOS TODOS IGUALES ¿NO? JÉ-JÉ...

SÍ, CLARO. PERDÓN, ¿EL SR. ES.....

Declaración de conflictos de interés.

- No recibimos auspicio de ninguna clase.
- No hemos recibido financiamiento para este trabajo.
- No pertenecemos a ninguna organización que involucre remuneración asociado al manejo de pacientes adictos.
- El ingreso de pacientes al programa de reinserción de la SACH no genera ingresos personales ni institucionales.
- Ningún laboratorio o empresa ha aportado fondos para las actividades del CSO.

Había una vez...

Partimos el año
2006.

Hospital San José

¿Por qué?

Por un amigo.

[Home](#) → [Delivering Care](#) → [Reducing Opioid Abuse & Misuse](#)

Task Force to Reduce Opioid Abuse

Jump to:

[5 Goals of the Task Force](#)

[Task Force Members](#)

Numerous state and federal officials have urged physicians and other health care professionals to show the necessary leadership to confront the nation's opioid epidemic. The AMA Task Force to Reduce Opioid Abuse agrees that physicians have a professional obligation to reverse the epidemic.

5 Goals of the Task Force

1. Increase physicians' registration and use of effective Prescription Drug Monitoring Programs (PDMPs)
2. Enhance physicians' education on effective, evidence-based prescribing
3. Reduce the stigma of chronic pain and promote comprehensive assessment and treatment
4. Reduce the stigma of substance use disorder and enhance access to treatment
5. Expand access to naloxone in the community and through co-prescribing

Physicians' progress to reverse nation's opioid epidemic

Nation's opioid supply decreasing

Every state in the nation saw a reduction in opioid prescribing in 2015—an overall 10.6 percent decrease nationally.¹

From 2012 to 2015 there has been a steady decrease in sales of the most widely misused opioid analgesics.²

As PDMPs improve, physicians' use increases

State-based prescription drug monitoring programs (PDMPs) were checked nearly 85 million times in 2015—a 40 percent increase over 2014.³

Physicians' and other health care providers' registration to use PDMPs also increased from 464,698 in 2014 to 616,789 in 2015.⁴

Increases were seen in states with—and without—mandates to use a PDMP.

More physicians trained to treat opioid use disorders

From 2012 to 2016 there has been an 81 percent increase in physicians certified to treat substance use disorders—more than 33,000 across all 50 states.⁵

Prescriptions to help treat opioid use disorders increased by 11 percent from 2014 to 2015.⁶

Physicians taking more education

An AMA survey⁷ found that 49,903 courses related to opioid prescribing, pain management, or other related areas have been accessed and/or completed by physicians since October 2015.

New AMA-created continuing medical education (CME) products soon to be released:

- Statewide physician toolkits (in two pilot states) to highlight key resources to help reduce opioid-related harm, provide guidance on prescribing practices and direct patients to additional resources
- CME primer on the opioid epidemic
- Module for "Introduction to the Practice of Medicine" library—focus on residents

15 states showing decreases in total drug overdose deaths

According to the CDC, 15 states saw reductions in the numbers of people dying in 2014 compared to 2013 due to drug overdoses.⁸

Naloxone access laws, physician co-prescribing on the rise

In the second quarter of 2015, 4,291 prescriptions were dispensed, a 1,170 percent increase over prescriptions in the fourth quarter of 2013.⁹

AMA advocacy and widespread state medical society support has led to more than two dozen new state laws that increase access to naloxone—bringing the national total to more than 45 states with naloxone access laws.

AMA, nation's medical societies continue to urge action

Since October 2015 more than 4 million emails, social media posts and other communications urging physician action to reverse national opioid epidemic have been directed at physicians by the nation's medical societies.

1. IMS Health

2. DEA Office of Diversion Control, Automated Reports and Consolidated Ordering System, http://www.deadiversion.usdoj.gov/arcos/retail_drug_summary/index.html

3. Substance Abuse and Mental Health Services Association

4. IMS Health

5. MMWR/January 1, 2016/Vol. 64/Nos. 50&51

6. Based on an AMA survey and responses from 42 state PDMP administrators. Figures will be adjusted as new information becomes available.

7. AMA survey of 37 medical societies. New information will be added as it becomes available.

8. Am J Public Health. 2016 Apr;106(4):689-90. Jones et al. doi: 10.2105/AJPH.2016.303062. Epub 2016 Feb 18.

The AMA Task Force to Reduce Opioid Abuse

ama-assn.org/go/endopioidabuse

La Asociación
Americana de
Medicina
Epidemia de
consumo de
opioides!!!!
Mas de 200.000
muertos al año!!!

© JP Alvarez 2016

SOCIEDAD DE
ANESTESIOLOGÍA
DE CHILE

Recomendaciones para el Manejo de Estupefacientes y Sustancias Controladas

COMITÉ DE SALUD OCUPACIONAL SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGÍA DE CHILE

Vol. 28, Núm. 5, Septiembre - Octubre 2017,
Tema central: Anestesiología clínica
páginas 649-812

Compartir Imprimir Descargar PDF

Apartados

DOI: 10.1016/j.rmcl.2017.08.009

Open Access

[resumen](#)

[palabras clave](#)

[summary](#)

[keywords](#)

[introducción](#)

...

SANANDO AL SANADOR

HEALING THE HEALER

Juan Pablo Acuña , Juan Pablo Álvarez, Piero Cánepa

Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor, Clínica Las Condes, Santiago, Chile. Sociedad de Anestesiología de Chile. Comité de Salud Ocupacional

Este artículo ha recibido

715

Visitas

Under a Creative Commons license

COMISIÓN DE RIESGO PROFESIONAL

COORDINADOR

- Dr Gustavo Calabrese. Uruguay SUA

MIEMBROS

- Dra. Laura Perez. Costa Rica AMACR
- Dr Roger Pasquier. Nicaragua ANARE
- Dr Sergio Muñoz. Argentina FAAAAR
- Dr Martin Meiriño. Argentina FAAAAR
- Dr. Leonardo Ghioldi. Argentina FAAAAR
- Dr Sylvio Lemos. Brasil SBA
- Dr. Hamilton Lama. Ecuador SEA
- Dr Juan Carlos Bocanegra. Colombia SCARE
- Dr Juan Pablo Acuña. Chile SACH
- Dr Juan Pablo Alvarez. Chile SACH
- Dr. Mauricio Cierra. El Salvador AMAES
- Dra Maria Eugenia Interiano. Honduras SHARD
- Dra Nora Covarrubias. México FMCA
- Dr Luis Héctor Soto. México FMCA
- Dr Jorge Basurto. Perú SPAAR
- Dra Carmen Ciriaco. R. Dominicana SDA

♀ 27 años, soltera, sin hijos

Depresión en tratamiento, sociable pero aislada de vida personal
En 2do año de anestesia desarrollo una depresión.. un día no llegó.
Encontrada en casa con vía venosa y varias ampollas vacías de potasio y una succinil colina

♂ 65 años, divorciado, hijos

Muy sociable, Trabajólico
Abuso de opioides larga data
Redes de Apoyo
Tratamiento de adicción incompleto
Muerte por Sobredosis Propofol
Recaída? Suicidio?

♀ 57 años, separada hijos grandes

Tens Anestesia
Consumo de Petidina larga data
Múltiples trabajos
Tabaquismo
Soledad, Pobreza
Muerte por sobredosis morfina en baño de Hospital

♂ 33 años, soltero, sin hijos

Anestesiólogo, Sociable, buen profesional.
Sin sospecha de abuso de sustancias
Grave disfunción en su familia de origen y una relación de pareja muy patológica.
Encontrado muerto por sobredosis de Fentanilo, Suicidio?

♂ 30 años, soltero, sin hijos

TENS urgencias
Consumo de Morfina
No recibe tratamiento
Encontrado muerto por sobredosis 3 días de data
Vivía solo, sin amigos ni familia .

♂ 60 años, soltero, sin hijos

Anestesiólogo consolidado
Sociable solo en el trabajo
Autoexigente, Perfeccionista
Rasgos obsesivos
Suicidio por caída de altura

♂ 29 años, soltero, sin hijos

Becado Anestesia
Consumo de Propofol
No tratado
Reinsertado en programa de formación
Muerte por sobredosis

♀ 34 años enfermera, separada sin hijos

Sospecha consumo de Propofol
Licencia por depresión
Muerte por sobredosis
No fue intervenida ni tratada

♀ 38 años, enfermera mala relación de pareja

Buena funcionaria
Inicia consumo de Propofol no detectado
Licencia por depresión
Reingreso laboral, muerte por sobredosis de propofol

Anestesiólogos y Residentes

Casos CSO 2006-2017

Caso	Fentanilo	Petidina	Metadona	Midazolam	Ketam	Propofol	Etomidato	Gases	Otras Sustancias
1	+								Tramadol
2	+	+							
3								Sevofluoran	Marihuana Alcohol
4	+			+	+	+	+		Marihuana
5 F	+								Marihuana
6	+				+	+			
7 F	+				+	+			Cocaína
8F	+		+						Marihuana

Como se detecta un caso

- Siempre parte con una llamada
 - ✓ Sospechamos de alguien hace meses
 - ✓ Se pierden estupefacientes
 - ✓ Encontramos a un colega con sobredosis
- No se quien es pero
 - ✓ La EU no le cuadran los estupefacientes y recetas
 - ✓ Se pierden Tramadol y las Efedrinas
 - ✓ Aumento el uso , sin que halla aumentado

Como se inicia un caso

- Encontramos esto

El Primer consumo

- Sentí que todo mis problemas se arreglaban
- La Angustia al fin se disipó
- Se me borraba todo el malestar
- Ese dolor insoportable ya no existía

El Primer consumo

- Sentí que todo mis problemas se arreglaban
- La Angustia al fin se disipó
- Se me borraba todo el malestar
- Ese dolor insoportable ya no existía

Tolerancia y Progresión

- Necesitaba ponerme más dosis
- Ya no era el mismo alivio
- La Angustia reapareció
- Empecé a usar opioides potentes

Abstinencia

- La Angustia era permanente si no obtenía "mis dosis"
- El dolor era ahora en todo el cuerpo
- Imposible dormir sin usar la sustancia
- Empecé a preferir morirme a seguir con esta sensación

Compulsión

- Estaba todo el día pensando lo que sentiría al inyectarme de nuevo
- Me angustiaba pensar que no conseguiría más dosis
- Mis actividades diarias giraban en torno a obtener más opioides
- Quería pasar todo el tiempo en el hospital

Soledad Culpa

La Conspiración del Silencio

Dolor crónico ATM, Anestesiólogo 38 años sub especialista en cirugías de alta complejidad con vida familiar estable.

- Administración repetida de petidina EV por sus colegas
- Porgresión del consumo → altas dosis de fentanyl y petidina
- Cambios de carácter y manejo sospechoso de opioides
- Completó seguimiento 5 años y actualmente anestesiólogo
- 16 años en Abstinencia

Llamada de ayuda por sospecha: pérdida de opioides sin sospechoso(a)

- 31 años anesthesióloga , soltera con un hijo de 2 años
- Muy buenas relaciones con su servicio
- Doble turno y frecuentes reemplazos para solventar gastos
→ Inicia consumo de metadona para aliviar su angustia
- En la Intervención....creí que nunca se acabaría esta pesadilla
- Aceptó completó tratamiento y se reinsertó laboralmente
- Lleva 7 años desde inicio de tratamiento

¿Qué hacer en caso de una Sospecha?
→ Siempre Investigar

Intervención

- Cuales son los hechos
- Tiene Red familiar de apoyo
- La institución apoya?
- Hay red laboral
- Patrones de comportamiento

Planificar Intervención

Inicio Tratamiento

- Equipo terapéutico
- Red de Apoyo
- CSO/institución
- Formación de tutores
- Mejoras del control
- Apoyo al ambiente de trabajo

Manejo de Casos CSO

Respaldo
Institucional

Tratante, Terapia Familiar,
Monitor y Tutor

Reinserción

Reintegro
Gradual

Monitoreo
Permanente

Protocolo y Contrato

*Guidelines on Suicide Amongst Anaesthetists. Anaesthesia 2020

***Mortalidad por Suicidio
Población General UK**
✓ ♂ : ♀ = 4:1

*Suicidio Médicos(as) UK

♂ : ♀ = 5:1 (2011)

♂ : ♀ = 1:1 (2017)

Review Article

Suicide in anaesthetists: a systematic review

E. Plunkett,¹ A. Costello,² S.M. Yentis^{3,4} and K. Hawton^{5,6}

Anaesthesia Abril 2021

- Suicidio por Sobredosis (ONS UK)
 - ✓ Anestesiastas 86%
 - ✓ Todos los médicos 39%
 - ✓ Población Gral. 33%
 - ✓ Hipnóticos, BNM, Ansiolíticos
- Propofol en reportes de autopsias de posibles suicidios
- Conductas Suicidas
 - ✓ Ideación 3,2% - 25%
 - ✓ En estado Depresivo 23% asociados a ideación
 - ✓ Intento de Suicidio 0.5%-2%

- Considerar que es un **riesgo ocupacional** común a todo anesthesiólogo y siempre presente
- Mantener **comités estables** de consulta a quien recurrir
- Medidas administrativas y/o legales de **protección**

- Educación a residentes, anesthesiólogos y personal no médico
- Sistemas y Medidas de Control: almacenaje, dispensa y manipulación estrictos que pueden evitar el abuso inadvertido

- Debemos crear más redes de apoyo en Chile
- Comités de consulta para detectar precozmente , derivar a tratamiento y facilitar la reinserción

Soledad

Altruismo

Cercanía

Acompañamiento

MUCHAS GRACIAS!

Comité de Salud Ocupacional
Sociedad de Anestesiología de Chile